





ហាន់តាវីរុស (Hantavirus)

តារាងទិន្នន័យ



ហាន់តាវីរុស គឺជាក្រុមនៃវីរុសដែលភាគច្រើនផ្ទុកដោយសត្វកំរិតខ្លះៗ។ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក នេះរួមមានកណ្តុរ និងកណ្តុរតូចមួយចំនួន។ ការឆ្លងហាន់តាវីរុសអាចបង្កឱ្យមានរោគសញ្ញាផ្សេងៗ។



ហាន់តាវីរុសរាលដាលតាមរយៈការដកដង្ហើមយកទឹកមាត់ ទឹកនោម លាមក ឬសម្បុរសំបុករបស់សត្វកំរិតដែលមានមេរោគ និងស្ថិតនៅក្នុងខ្យល់។ វាកម្រណាស់ដែលការខាំរបស់សត្វកំរិតអាចបង្កឱ្យមានហាន់តាវីរុស។ ជាទូទៅ វាមិនឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទេ។


សញ្ញា និងរោគសញ្ញា



គ្រុនក្តៅ និងញាក់



ឈឺសាច់ដុំ



ឈឺក្បាល



ចង្អោរ និងក្អួត



រាត



ក្អក

រោគសញ្ញាក៏អាចរួមមានវិលមុខផងដែរ។ ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ ការដកដង្ហើមខ្លី និងការក្អកអាចនាំឱ្យមានការប្រមូលផ្តុំទឹកក្នុងសួត និងការខ្វះអុកស៊ីសែនធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងឈាម។ រោគសញ្ញាជាទូទៅចាប់ផ្តើមពីមួយសប្តាហ៍ទៅប្រាំបីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់។



សូមពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកមានសញ្ញា និងរោគសញ្ញាទាំងនេះ បន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់ជាមួយសត្វកំរិត។ មិនមានការព្យាបាលសម្រាប់ហាន់តាវីរុសទេ។


ការការពារហាន់តារីរុស

វិធីល្អបំផុតដើម្បីការពារហាន់តារីរុស គឺត្រូវកម្ចាត់ប្រភពអាហារ ទឹក និងវត្ថុដែលផ្តល់ជាជម្រកដល់សត្វកកោរ។



បិទជិត

បិទរន្ធ ឬចន្លោះនៅខាងក្នុង និងខាងក្រៅផ្ទះ



ដាក់អន្ទាក់


ប្រើអន្ទាក់បក់ដើម្បីចាប់ កណ្តុរ និងកណ្តុរតូច



សម្អាត

កម្ចាត់ប្រភពអាហារដែលអាច ជាអាហាររបស់សត្វកកោរ

ដើម្បីសម្អាតភស្តុតាងនៃសត្វកកោរ៖



បើកទ្វារ និងបង្អួច ដើម្បីឱ្យ ខ្យល់ស្រស់ចូលយ៉ាងហោចណាស់ 30 នាទី មុនពេល សម្អាតតំបន់នោះ



ពាក់ស្រោមដៃ និងម៉ាស់ ឆ្នល់ មុនពេល សម្អាត



កុំប្រើម៉ាស៊ីនបូមធូលី ឬអំបោស ដើម្បីសម្អាត លាមក ឬសម្ភារៈសំបុក



បាញ់លាមកសត្វកកោរ ជាមួយទឹកលាយសារធាតុ ប្លិច ហើយបន្ទាប់មកប្រើ ក្រដាសជូតដើម្បីយកទឹក នោម និងលាមក

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់៖



1. www.maine.gov/dhhs/hantavirus
2. www.cdc.gov/hantavirus
3. www.cdc.gov/healthy-pets/rodent-control/

អនក៏អាចហៅទូរស័ព្ទទៅ Maine CDC តាមលេខ 1-800-821-5821។