



Hantavírus

Ficha técnica



Hantavírus são um grupo de vírus principalmente transmitidos por certos roedores. Nos Estados Unidos, inclui alguns ratos e camundongos. A infecção por hantavírus pode causar diferentes síndromes.



O hantavírus é disseminado ao inalar saliva, urina, fezes ou materiais de ninho de roedores infectados pairando no ar. Raramente a mordida de um roedor causa a infecção por hantavírus. Normalmente, não se espalha de pessoa para pessoa.

Sinais e sintomas



Febre e calafrios



Dor muscular



Dor de cabeça



Náusea e vômito



Diarreia



Tosse

Os sintomas também podem incluir tontura. Em casos graves, falta de ar e tosse podem levar ao acúmulo de líquido nos pulmões e à grave falta de oxigênio no sangue. Os sintomas geralmente começam de uma a oito semanas após a exposição.



Converse com seu profissional de saúde se você apresentar algum desses sinais e sintomas após contato com roedores. Não existe tratamento para o hantavírus.

Prevenção do hantavírus

A melhor forma de prevenir o hantavírus é remover as fontes de alimento, água e itens que oferecem abrigo para roedores.



Vedar

Vede buracos ou espaços dentro e fora da casa



Prender

Use armadilhas para capturar ratos e camundongos



Limpar

Elimine possíveis fontes de alimento para roedores

Para limpar evidências de roedores:



Abra portas e janelas para deixar entrar ar fresco por pelo menos 30 minutos **antes** de limpar a área



Use luvas e máscara contra poeira **antes** de limpar



Nunca use aspirador de pó ou vassoura para limpar fezes ou materiais de ninho



Borrife as fezes de roedor com água sanitária e água e depois use uma toalha de papel para recolher urina e fezes

Para mais informações, acesse:



1. www.maine.gov/dhhs/hantavirus
2. www.cdc.gov/hantavirus
3. www.cdc.gov/healthy-pets/rodent-control/

Você também pode ligar para o CDC do Maine: 1-800-821-5821.